

INFORMACJA DLA PACJENTA

*Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Leżajsku
Pracownia RTG
Rejestracja tel: (17) 24 04 921*

BADANIE KONTRASTOWE PRZĘŁYKU

Jest to obrazowa metoda badania górnego odcinka przewodu pokarmowego uwidaczniająca przełyk, żołądek i dwunastnicę przy pomocy promieni rentgenowskich z użyciem środków kontrastowych.

Wskazania do badania:

- dysfagia (trudności w przełykaniu),
- odynofagia (ból przy połykaniu),
- podejrzenie zwężeń przełyku,
- podejrzenie nowotworu przełyku,
- refluks żołądkowo-przełykowy,
- podejrzenie achalazji przełyku, uchyłków i przetok przełykowo-tchawiczych,

Przeciwwskazaniem do wykonania badania jest:

- ciąża,
- uczulenie na środek kontrastowy,

W przypadku podejrzenia perforacji stosuje się kontrast wodnorozpuszczalny.

Przygotowanie do badania:

- 2-3 dni przed badaniem stosować dietę lekkostrawną,
- w dniu badania nie należy przyjmować jakichkolwiek posiłków i napojów.

Przebieg badania:

- badanie wykonywane jest w pozycji leżącej lub stojącej,
- pacjent wypija odpowiednią ilość środka kontrastowego zleconą przez lekarza,
- podczas połykania kontrastu wykonywana jest seria zdjęć rentgenowskich,
- lekarz obserwuje : przechodzenie kontrastu przez przełyk, obecność; zwężeń, uchyłków i guzów, zaburzenie motoryki i ewentualne cofanie się kontrastu,
- w trakcie badania pacjent może być proszony o zmianę pozycji,
- badanie trwa 10-20 minut.

Możliwe powikłania badania:

- zaparcia,
- wzdęcia, przelewania i dyskomfort w brzuchu,
- nudności.

Postępowania po badaniu:

- spożywanie dużej ilości płynów,