

INFORMACJA DLA PACJENTA

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Leżajsku
Pracownia RTG
Rejestracja tel: (17) 24 04 921**

WLEW DOODBYTNICZY

Jest to radiologiczne badanie jelita grubego. Polega na doodbytniczym wprowadzeniu środka cieniującego (najczęściej zawiesiny barytowej) oraz powietrza przez dren do jelita i wykonaniu serii zdjęć rentgenowskich.

Wlew doodbytniczy jest wskazany głównie do diagnostyki chorób jelita grubego (np. owrzodzeń, uchyłków, polipów, guzów) oraz w przypadku objawów takich jak krwawienie z odbytu, przewlekłe zaparcia, biegunka, ból brzucha. Jest to badanie alternatywne lub uzupełniające dla kolonoskopii.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania jest:

- ciąża,
- uczulenie na środek kontrastowy,
- podejrzenie perforacji jelita.

Przygotowanie do badania:

- 2-3 dni przed badaniem stosować dietę lekkostrawną,
- w dniu poprzedzającym badanie należy zgodnie z zaleceniami lekarza oczyścić jelito za pomocą preparatu przeczyszczającego lub lewatyw,
- w dniu badania nie należy przyjmować jakichkolwiek posiłków, można pić dowolną ilość niegazowanej wody.

Przebieg badania:

- badanie wykonujemy w pozycji leżącej,
- w początkowej fazie badania zakładany jest dren do odbytnicy i podawany jest środek kontrastowy,
- po podaniu kontrastu w trakcie skopii lekarz radiolog wykonuje zdjęcia rtg w różnych projekcjach w zależności od przebiegu badania,
- w następnej fazie badania (również doodbytniczo) podawane jest powietrze,
- po badaniu dren zostaje usunięty z odbytu,
- decyzję o sposobie wykonania badania, dodatkowych projekcjach i zakończeniu badania podejmuje lekarz radiolog.

Możliwe powikłania badania:

- podrażnienie lub uszkodzenie śluzówki odbytu,
- ból brzucha,
- zaburzenia czynności serca, arytmia (w czasie rozciągania odbytnicy),
- zaparcia związane z zaleganiem kontrastu,
- krwawienie z odbytu,
- narażenie na nadmierną dawkę promieniowania jonizującego,
- reakcje alergiczne na podanie środka kontrastowego,
- uszkodzenie ścian przewodu pokarmowego.

Postępowania po badaniu:

- spożywanie większej ilości płynów,
- w przypadku silnych bólów brzucha przedłużającego się braku wypróżnienia, gorączki i krwawienia z odbytu pacjent powinien się pilnie skontaktować z lekarzem.